

Informations personnelles / Persönliche Angaben

Nom: Lociciro

Prénom: Stéphanie

Profession : Responsable de recherche

Institution : CHUV/IUMSP/CEESAN

Titre de la présentation / Titel der Präsentation

Hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes en Suisse : résultats de l'enquête Gaysurvey (1992-2014)

Abstract (max 300 signes/Zeichen) – court résumé de la présentation / kurze Zusammenfassung der Präsentation.

Objectifs

A partir des données de surveillance des comportements face au VIH/Sida, présenter les tendances concernant la gestion du risque chez les HSH.

Méthodologie

La onzième enquête suisse Gaysurvey sur les comportements des HSH s'est déroulée en 2014 via un questionnaire Internet, anonyme auto-administré, accessible sur différents sites gays. La période de référence est *au cours des 12 derniers mois*.

Résultats

834 personnes éligibles, habitant la Suisse, ont répondu au questionnaire.

La fréquentation des lieux de rencontre traditionnels visités en majorité par des homosexuels tend à diminuer depuis 1998: bars gays, disco (-25 points, soit 62.6% en 2014), parcs et toilettes publiques (-37 points, 26.1%). La fréquentation des saunas gays et sex-clubs reste relativement stable (62.2%).

Entre 1992-2014, on observe une tendance à la hausse concernant la non utilisation systématique du préservatif avec le partenaire stable (73% en 2014) et avec les partenaires occasionnels (30.4%). La proportion de HSH, ayant eu au moins un rapport non protégé avec un partenaire de statut sérologique différent ou inconnu dans les douze derniers mois, est en constante augmentation depuis 1994 (+9 points, 19.5% en 2014).

En 2014, la consommation régulière de produits lors de relations sexuelles reste fréquente. L'alcool arrive en tête (49.8%), suivi des poppers (33.2%), du Viagra® (20.8%) et enfin du cannabis (14.7%).

Moins de 3% des répondants se sont injecté des drogues au cours de leur vie (N=24). Aucun échange ou utilisation de matériel usagé servant à l'injection n'a été déclaré. Près de 14%

Journée Safer Nightlife Suisse 24 septembre 2015, Lausanne

des répondants ont inhalé ou sniffé des drogues au cours du dernier mois (N=115). Parmi eux, plus du tiers a déjà utilisé du matériel usagé servant à ces pratiques.

Conclusion

La tendance est à la diminution des pratiques de safer sex parmi les HSH. Il est nécessaire de renforcer les interventions de prévention dans cette population.